Nos conseils de prévention

Crèche

Risque biologique

Comment éviter l'exposition à des agents infectieux?

Hygiène des personnes:

- **Lavez-vous les mains régulièrement** (lavage ou friction hydroalcoolique) et systématiquement après un change, une toilette, mouchage, manipulation de linge souillé), avant les repas .
- **Portez des gants** chaque fois qu'il y a un risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, des muqueuses, une peau lésée, des déchets.
- **Protégez** vos plaies avec un pansement.
- **Informez** le personnel (et les parents) dès qu'un cas de maladie transmissible est signalé.

Hygiène des locaux et du matériel:

- **Respectez** les procédures de nettoyage, de désinfection des jouets et des surfaces souillés.
- **Respectez** l'organisation des circuits d'élimination du linge souillé, des déchets
- **Aérez l**es locaux
- **Limitez** le nombre de produits d'entretien afin de favoriser leur utilisation correcte.

Protégez vous: Portez des gants

EN ISO 374-5
Protection contre les champignons, bactéries, virus

De préférence en vinyl ou en nitrile
Latex = risque allergie

La femme enceinte

Certaines maladies infectieuses anodines et pouvant passer inaperçues chez l'enfant et l'adulte peuvent avoir des conséquences pour le foetus en développement.

En cas de projet de grossesse, prévenez votre médecin du travail.



© Tous droits réservés-STI-202603-V01

Contactez-nous

02 98 55 54 43
contact@stc-quimper.org
2 rue Louison Bobet, Quimper
www.stc-quimper.fr

santé au travail
en Cornouaille

MALADIE/SOURCES DE CONTAMINATION	RISQUE POUR LE PERSONNEL	PREVENTION POUR LE PERSONNEL
COQUELUCHE *(Bactérie)* Gouttelettes de salive	→ Risque de développer la maladie → Risque de transmettre la maladie aux nouveaux nés (risque de gravité importante si le bébé a moins d'un an)	→ Vaccination recommandée à l'âge adulte lors des rappels diphtérie/tétanos/polio à 25 ans, 45 ans, et 65 ans → La vaccination contre la coqueluche est recommandée pour les professionnels ayant une injection datant de plus de 5 ans dans le cas d'une urgence sanitaire (contexte épidémique et un risque de grands rassemblement favorisant une grande circulation de la coqueluche)
ROUGEOLE *(Virus)* Gouttelettes de salive Contact avec des mains souillées ou des surfaces contaminées par des sécrétions (salive, écoulement nasal)	→ Risque de complications plus importante à l'âge adulte (pneumonie, encéphalite…) → Risque de transmettre la maladie aux nouveaux nés → Risque de formes graves pour les femme enceinte	Vaccination : → Les personnes nées depuis 1980 : 2 doses de vaccin trivalent, voire 3 doses pour les personnes qui ont reçu une 1ère dose de vaccin avant l'âge de 12 mois → En cas de méconnaissance du statut vaccinal, il est recommandé de réaliser deux doses à au moins un mois d'intervalle, sans sérologie préalable
OREILLONS *(Virus)* Gouttelettes de salive	→ Risque de complications plus importante à l'âge adulte (surdité, stérilité…) → Augmentation de la fréquence des avortements lors du 1er trimestre de grossesse	→ Les personnes nées avant 1980, non vaccinées et sans antécédent connu de rougeole ou de rubéole, doivent recevoir une dose de vaccin trivalent rougeole-oreillons-rubéole
RUBEOLE *(Virus)* Gouttelettes de salive	→ Risque pour le fœtus si la maladie est contractée pendant la grossesse	→ La vaccination contre la rougeole, la rubéole et les oreillons est contre-indiquée pendant la grossesse
VARICELLE *(Virus)* Gouttelettes de salive Contact avec les lésions bulleuses	→ Risques de complications chez la femme enceinte non immunisée → Risque de transmettre la maladie aux nouveaux nés	→ Consulter votre médecin si vous êtes enceintes et que vous avez été en contact avec un sujet malade → Vaccination recommandée pour les femmes en âge de procréer si désir de grossesse et pas d'antécédent clinique de varicelle. Attention cependant car développement possible d'une petite varicelle lors de la vaccination.
CYTOMEGALOVIRUS *(Virus)* Contact avec les liquides biologiques (Salive, urine, selles, larmes, sang)	→ En cas d'infection pendant la grossesse, risque de transmission au fœtus, d'avortement ou de séquelles graves	Si vous êtes enceinte : - Portez des gants avant tout risque de contact avec des liquides biologiques - Hygiène des mains +++ notamment après chaque change, toilette… - Evitez le partage des objets (ustensiles de repas, jouets mis à la bouche…)
HEPATITE A, B, C *(Virus)* Contact avec les liquides biologiques (Salive, urine, selles, larmes, sang)	→ Risque de développer la maladie	→ Vaccination : - Hépatite B (obligatoire si exposé) - Hépatite A (recommandée) → Hygiène des mains → Porter des gants lors des contacts avec les liquides biologiques
GRIPPE *(Virus)* Gouttelettes de salive	→ Risque de développer la maladie	→ Vaccination recommandée chaque année